



LAWSONIA

UM INIMIGO INVISÍVEL

A iJeíte causa um prejuízo de  
**\$ 2,73 a \$ 19,75**  
(dólares) por suíno

Presente em **mais de 90%**  
das granjas do mundo

LAWSONIA INTRACELLULARIS  
O INIMIGO INVISÍVEL QUE ESCONDE O  
POTENCIAL DA SUINOCULTURA

A iJeíte causa um prejuízo estimado de  
suíno<sup>(1)</sup> e está presente em mais de 90% das granjas do mundo

*Quanto maior é a  
pressão de infecção  
pela Lawsonia  
intracellularis, maior  
é o impacto na  
Conversão Alimentar*

Por que prevenir  
a ileíte subclínica?



*Quanto maior é a  
pressão de  
infecção pela  
Lawsonia  
intracellularis,  
maior é o  
impacto na  
Conversão  
Alimentar*

GRUPOS	INÓCULO DOSE	LESÕES GRAVES	IHC	PONTUAÇÃO FECAL	GPD	CA
A	SPG	0.00 <sup>a7</sup>	0.00 <sup>a</sup>	0.08 <sup>a</sup>	0.40 <sup>a</sup>	1.63 <sup>a</sup>
F	3,2X10 <sup>4</sup>	0.05 <sup>ab</sup>	0.57 <sup>b</sup>	0.18 <sup>a</sup>	0.25 <sup>b</sup>	2.07 <sup>b</sup>
E	3,8X10 <sup>5</sup>	0.13 <sup>ab</sup>	0.64 <sup>b</sup>	0.43 <sup>a</sup>	0.23 <sup>b</sup>	2.10 <sup>b</sup>
D	2,2X10 <sup>6</sup>	0.33 <sup>b</sup>	0.78 <sup>b</sup>	0.37 <sup>a</sup>	0.24 <sup>b</sup>	2,24 <sup>bc</sup>
C	7,2X10 <sup>7</sup>	0,25 <sup>ab</sup>	0,66 <sup>b</sup>	0,93 <sup>b</sup>	0,19 <sup>b</sup>	2,51 <sup>bc</sup>
B	2,4X10 <sup>8</sup>	0,25 <sup>ab</sup>	0,62 <sup>b</sup>	1,34 <sup>b</sup>	0,16 <sup>b</sup>	2,92 <sup>c</sup>

Parâmetros clínicos e de desempenho, e achados macroscópicos e histológicos em suínos com administração de doses variadas de *L. intracellularis* (Paradis et al., 2005 - ASSV).

# Benefícios de Porcilis Ileitis no campo



MSD Brasil no  
ESPHM

## MELHORIA NOS PRINCIPAIS ÍNDICES:

Taxas Produtivas na granja (leitões em crescimento-terminação)	NVAC (N=6 lotes, total de 7947 animais)	VAC (N=8 lotes, total de 6510 animais)
Conversão Alimentar*	2,52 ( $\pm 0,11$ )	2,32 ( $\pm 0,12$ )
Ganho de peso médio diário*	0,935 ( $\pm 0,035$ )	0,98 ( $\pm 0,018$ )
Taxa de mortalidade* (%)	3,317 ( $\pm 0,39$ )	1,66 ( $\pm 0,63$ )

Tabela 1. Média e erro padrão das taxas VAC e NVAC de produção na granja: Conversão alimentar, Ganho de Peso Médio Diário e Taxa de Mortalidade de leitões na fase de crescimento-terminação. Diferenças significativas ( $P \leq 0,05$ ) são indicadas por um asterisco (\*).

200 gr de  
Diferença na  
C.A.


45 gr de  
Diferença no  
G.P.D.

# MSD Brasil no ESPHM



## *Benefícios de Porcilis Ileitis no frigorífico*

7,8 kg de  
diferença






# MSD Brasil no ESPHM



## *Benefícios de Porcilis Ileitis no frigorífico*

**2,15 metros  
a mais**




# Benefícios de Porcilis Ileitis no frigorífico



MSD Brasil no  
ESPHM

82 gramas  
a mais por  
metro





ATINGIMOS A  
MARCA DE MAIS DE

**30 MILHÕES**

DE SUÍNOS VACINADOS COM  
PORCILIS® ILEITIS NO BRASIL.

ATUALMENTE,

**40%**

DO REBANHO  
DE SUÍNOS  
NACIONAL

JÁ É VACINADO PELA MSD SAÚDE ANIMAL CONTRA ESSE  
INIMIGO INVISÍVEL, A **LAWSONIA INTRACELLULARIS**.

**FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DESTA MOVIMENTO!**

